



GKorganik
GÜBRE

Toprağınız bizimle hayat bulsun

www.gkcorganik.com.tr





HAKKIMIZDA

GKC Organik Gübre Firması olarak deneyimli kadromuzla ülkemizde sağlıklı toprak yapısının gelişimini sağlamak için organik gübre üretimine başlamış bulunmaktayız. Tarımda devamlılığın sağlanabilmesi için öncelikle toprağımıza saygı duymamızın gerekliliğinin bilincindeyiz.

Bu amaçla kısa süreli ve geçici sonuçlar yerine ileriye dönük toprak yapısını düzenleyen, iyileştiren, su tutma kapasitesini arttıran, çoraklaşmayı engelleyip yapıyı düzelten, toprağı gençleştiren ve sağlıklı toprak yapısıyla, sağlıklı mahsül elde eden çevre dostu bir oluşum hedeflemekteyiz.

Günümüz şartlarında çiftçilerimiz minimum üretim maliyeti ile maksimum verimi almak için sürekli bir mücadele içerisindeyler.

Biz de çiftçilerimize bu bağlamda uzun vadeli, son derece etkili çözümler üretmeyi kendimize görev edindik. Bu sayede üreticinin kazancını arttırırken, çevresel zararı minimuma indirerek sadece çiftçiye değil geleceğe de fayda sağlamayı amaçlamaktayız.



Toprağınız bizimle hayat bulsun

GKC ORGANİK

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ KATI ORGANİK GÜBRE
GKC ORGANİK

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Organik Madde	%40
Organik Karbon	%18
Toplam Azot (N)	%2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%2
Maksimum Nem	%20
pH	5-7



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

TARIM ÇEŞİDİ	ÜRÜN ÇEŞİTLERİ		MİKTARI KG/DA	KULLANIM ŞEKLİ
TARLA BİTKİLER	SEBZELERDE	Salatalık, Patlıcan, Domates, Fasulye, Biber, Karpuz vb.	100-150	Fide dikim öncesi toprakla karıştırılır.
	TAHILLARDA	Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar, Çeltik vb.	50-75	Ekimden önce mibzer veya fırfırla toprağa karıştırılır.
	ÇİLEKTE		100-150	Ekim öncesi toprağa karıştırılır.
	SANAYİ BİTKİLERİNDE	Şeker pancarı, Patates, Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Çeltik vb.	75-100	Dikim öncesi toprakla karıştırılır.
SERA BİTKİLER	SEBZELERDE	Salatalık, Patlıcan, Domates, Fasulye, Biber, Karpuz vb.	100-150	Dikim öncesi toprakla karıştırılır.
	SÜS BİTKİLERİNDE	Yeşil alanlarda, kesme çiçekçilikte	75-100	Dikim öncesi toprakla karıştırılır.
BAĞ-BAHÇE BİTKİLERİ	Üzüm, Elma, Kayısı, Kiraz, Zeytin, Muz, İncir, Fındık, Ceviz, Tüm Narenciye Bitkileri vb.	Tam Bodur	1-3 Kg	Ağaç taç izdüşümüne 10-15 cm toprağa gömülerek uygulama yapılır. (Kullanım Miktarı Ağaç Başınadır)
		Yarı Bodur	2-4 Kg	
		Klasik Ağaç	2-5 Kg	



Kullanım Alanları

- Açık ve kapalı alanlardaki sebze ve meyve üretiminde,
- Tahıl ve Sanayi bitkileri tarımında,
- Çiçek ve Süs bitkileri üretimi ve bakımında,
- Spor alanları, çim sahalar, parklar ve yeşil alanlarda,
- Toprağın yumuşatılarak havalandırıp kıvama getirilmesi işleminde,
- Erozyon önlemede, yanmış, asitleşmiş, yıkanmış ve çoraklaşmış toprakların ıslah edilmesinde,
- Toprakta tuzlanmanın giderilmesinde,
- Taban suyu yüksek alanlardaki tarımsal faaliyetlerde.

Toprağı Onarır.

- Kimyevi gübreler gibi zamanla kaybolmaz. Eriyip yok olmaz, rüzgarla savrulup gitmez.
- Toprakla özel bir bağ kurarak toprağın ayrılmaz bir bileşeni haline gelir, evsafını iyileştirerek toprağı zenginleştirir.
- Toprağı yumuşatır, havalandırır, toprak içerisindeki canlı yaşamını güçlendirir, topraktaki besin elementlerini yaşatır.
- Toprak ısını, topraktaki organik madde ve yararlı mikroorganizmaları artırır.
- En az üç uygulamadan sonra, toprağı sağladığı yararlar yıllarca devam eder.

Su Tutucudur.

- Tuttuğı suyu dengeli bir şekilde bırakarak kurak ortamlarda bitkileri korur.
- Gübreli suyun akıp gitmesini önleyerek gübreyi verimli kullanma olanağı sağlar.
- Killi topraklarda suyun yüzeyde kalıp buharlaşmasını, kumlu topraklarda suyun yer altına süzülmesini engeller. Dolayısı ile sulama için kullanılan su miktarında tasarruf sağlar.



AMINO PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Organik Madde	30
Organik Karbon	14
Organik Azot	2.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
Serbest Aminoasitler	6.5
pH Aralığı	4.5–6.5



AMİNO ASİT klorofil miktarını arttırarak bitki metabolizmasını hızlandırır ve verimini artırır.

Çevre, stres koşullarına karşı bitkiyi daha dirençli hale getirir.

Mevcut gübreleme programlarına dahil edilip hazırlanan solüsyonun hızlı alımına yardımcı olduğu gibi, toprakta hazır bulunan besin elementlerinin de bitkiye geçişine yardımcı olur.

GKC AMİNO PLUS

TOPRAK ve BİTKİ dengesini sağlamaktadır.

Bitkilerin bulundukları toprağa adaptasyonunu artırmakta ve iyi bir kök sistemi oluşumunu teşvik etmektedir.

Ayrıca içerisinde bulunan organik madde ve humik-fulvik asit sayesinde;

Bünyesindeki organik madde sayesinde NPK besin elementlerinin daha uzun süre toprakta kalmasını sağlar.

Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde ve ürünlerde sezon boyu kullanılacak bir üründür. Çiçeklenme ve ürün periyodu kısa olan bitkilerde döl tutma ve ürün bağlama için kullanılır. Organik madde ve humik-fulvik asit sayesinde toprağı düzenler ve toprağın organik madde değerini artırır. Bitkinin büyümesine, döl tutmasına ve ürünün kalitesi üzerinde etkilidir.

Zemin katyon değişim kapasitesini (KDK) artırır. Gübrelerin etkinliğini artırır ve besleyici sızıntısını azaltır. Kök gelişimini destekler. Köklerde hücre zarlarının geçirgenliğini artırır ve besin alımını artırır.



AMINO PLUS

Alkali topraklardaki mikro elementler için doğal kenetleyici olarak hareket eder ve bitkiler için kullanılabilirliğini artırır. Bitki uygulamalarıyla kuraklık ve stresten kaynaklanan stres azalır. Tohumların çimlenmesini artırır. Topraklardaki herbisitler ve toksit maddelerin kalıntılarını azaltır. Azotun süzülmesini önler. Azotun% 100'ünü bitki için kolayca temin eder.



Nasıl kullanılır: Ürün sıvı ve konsantre bir formdadır. Sulandırılarak sprey şeklinde bitkilere uygulandığı gibi sulama sistemleri ile (damlama ve yağmurlama) doğrudan toprağı veya gene bitki üzerine uygulaması yapılır.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek v.s)	Ekim dikimden itibaren haftalık uygulamalar şeklinde sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 250–350 cc	1200–1500 cc / da
Tüm Açık Alan Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek v.s)	Fidelerin şaşırtılmasından sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 200–300 cc	1000–1200 cc / da
Tüm Kışlık Sebzeler Kıvrıcık, Marul, Aysberg, Pırasa, Ispanak, Lahana	Fide döneminden itibaren 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 200–300 cc	1000–1200 cc / da
Kesme Çiçekçilikte	Çiçekten sonra 15 gün arayla sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 250–350 cc	1200–1500 cc / da
Kavun, Karpuz ve Kabak	Çiçek öncesi, yumru bağlama dönemi ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 250–350 cc	1200–1500 cc / da
Tüm Yumrulu Bitkiler (Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Turp, Ş. Pancar, Sarımsak v.s)	Çiçek öncesi, yumru bağlama dönemi ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 250–350 cc	1200–1500 cc / da
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Vişne, Kiraz, Kaysı, Ayva, Erik, Şeftali)	Farekulağı dönemi, meyve bağlama dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır.	100 litre suya 400–450 cc	1500–1750 cc / da 75–100 cc/ ağaç
Narenciye Muz Zeytin Kivi Antep Fıstığı	Farekulağı dönemi, meyve bağlama dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır.	100 litre suya 400–450 cc	1500–1750 cc / da 75–100 cc/ ağaç
Bağlarda	Çiçekten sonra, ince koruk dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır	100 litre suya 250–350 cc	1200–1500 cc / da
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Pamuk, Yer Fıstığı)	İkinci çapa sonrası her sulama suyu ile topraktan yirmi günde bir yapraktan uygulanır	100 litre suya 200–300 cc	1000–1200 cc / da
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Soya, Fasulye, Bakla, Börülce)	İkinci çapa sonrası her sulama suyu ile topraktan yirmi günde bir yapraktan uygulanır	100 litre suya 200–300 cc	1000–1200 cc / da
Tüm Yem Bitkileri ve Yeşil Alanlarda (Yonca, Korunga ve Fıg)	Her biçimden sonra sulama suyu ile topraktan ve yapraktan uygulanır	100 litre suya 200–300 cc	1000–1200 cc / da
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf, Pirinç)	Yabancı ot ilacı ile kardeşlenme döneminde yapraktan uygulanır	100 litre suya 200–300 cc	-----

DENGE 6-6-6

DENGE 6-6-6

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER NPK' lı SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE GKC DENGE 6-6-6

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	6
Organik Azot	0.5
Üre Azotu (NH ₂ -N)	5.5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	6
Toplam (Humik + Fulvik) Asit	10
Maksimum Klor (Cl)	0.5
pH Aralığı	4-6



GKC AMİNO PLUS

GKC Denge 6.6.6 yüksek oranda organik madde içeren dengeli bir gübredir.

Bitki gelişimini düzenlerken toprağın yapısını iyi hale getirir.

Toprak sıkışmasını önleyerek bitkinin daha kolay kök vermesini sağlar.

Toprakta ki mikrobiyal aktiviteyi arttırarak toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler. besin elementlerinin de bitkiye geçişine yardımcı olur.

TOPRAK ve BİTKİ dengesini sağlamaktadır.

Bütün bitkilerde dengeli gelişmeyi sağlar.

Sebze ve meyvelerde tat ve renk kalitesini arttırır.

Bitkilerde çiçeklerin daha sağlıklı beslenmesini sağlayarak meyve tutumunu arttırır.

Bitki besin maddesi eksiklikleri nedeniyle oluşabilecek arazları önler.



Nasıl kullanılır: Ürün sıvı ve konsantre bir formdadır. Sulandırılarak sprey şeklinde bitkilere uygulandığı gibi sulama sistemleri ile (damlama ve yağmurlama) doğrudan toprağa veya gene bitki üzerine uygulaması yapılır.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri ve Çilek	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 4-6 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 350-400 cc	2.5-3 litre /da
Tüm Tarla Açık Alan Sebzeleri ve Çilek	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Yaprığı Yenen Kışlık Sebzeler	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Kavun, Karpuz, Kabak	İlk meyve teşekkülünden başlanarak, meyve verme süresi boyunca 3 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Ş. Pancar, Havuç, Patates, Soğan ve Sarımsak vs.	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre /da
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları	Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre /da
Narenciye, Muz, Fındık	Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre /da
Bağlarda	Koruk teşekkülünden itibaren hasada kadar 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 350-400 cc	2.5-3 litre /da
Tüm Endüstri Bitkileri	Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Baklagiller	Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Tarla Bitkileri	Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde iki tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Yeşil Alan ve Yem Bitkileri	Her biçimden on gün sonra uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da

FULVİK ASİT

FULVİK ASİT

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER SIVI FULVİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	15
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit	15
Fulvik Asit	14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	1
pH Aralığı	3-5

W/W



GENEL ÖZELLİKLERİ

Hümk Asit bitkilerin strete olduđu dönemlerde ve sulama dengesizliklerinde suyu toprakta başlayarak bitkinin susuz kalmasını önler. Yapraktan kullanıldığında klorofil oluşumunu; fotosentezi hızlandırır,protein sentezini artırır, bitkinin solunumunu artırır. GK Fulvik doğal bir toprak düzenleyicisidir, bitkinin gelişimini ve verimini artırır. Suyun ve havanın toprak içinde hareketini düzenler ve bitkinin kullanımına sunar.

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenler ve bitkilerin daha sağlıklı, güçlü gelişmelerini sağlar. Böylece kaliteyi ve verimi artırır.

Fulvik asitler belirli mantarların ürettiği açık sarı veya kahverengi metabolitlerdir. Hayvan ve bitkiler öldükten sonra belirli mantar tipleri onların ayrışmalarına yardımcı olur. Bu ayrışmadan arda kalan ham organik bileşikler daha sonra toprağın bir parçası haline gelir. Fulvik Asit genellikle molekül komplekslerinin bir parçası olarak 70'den fazla mineral ve iz element içerir.Bunlar sonrasında bitki kökleri tarafından absorbe edilebilecek doğal formdadırlar ve canlı hücreler ile etkileşime girerler. Bitkiler kolayca, GK Fulvik'in büyük miktarını emer ve yapılarında korurlar. Bitki ile özdeş formu, taşıyıcı özelliği, organik kompleksin en rafine hali olarak emilimi bitki tarafından %95 oranında olan bitkileriniz ve toprağınız için hayat sütü diyebileceğimiz özel yapısı organik tamamlayıcı enzimler ve organik hormon sentezleri ile kombine edilmiştir.



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri, Kesme Çiçekçilikte ve Çilek	Ekim dikiminden hasada kadar vejetasyon süresi boyunca 10-15 gün ara ile 4-6 tekrerrde uygulanır.	100 litre su 150-200 cc	1-1.5 litre / da
Açık Alan Sebzeleri ve Çilek	Ekim dikiminden hasada kadar vejetasyon süresi boyunca 20 gün ara ile 4-6 tekrerrde uygulanır.	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Yaprağı Yenlen Kışlık Sebzeler (Marul, Lahana, Kıvırcık, Ispanak	Ekim dikiminden hasada kadar vejetasyon süresi boyunca 20 gün ara ile 3-4 tekrerrde uygulanır.	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Kavun, Karpuz ve Kabak	Ekim dikiminden 20 gün sonra, meyve bağlama ve meyve büyütme dönemi boyunca 3-4 tekrerrde uygulanır.	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak v.s	Ekim dikiminden 20 gün sonra, yumru bağlama ve yumru büyütme dönemi boyunca 3-4 tekrerrde uygulanır.	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Bağ	Sürgünler gelişime dönemin, çiçeklenme sonrası meyve büyütme dönemi uygulanır.	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem Fındık, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı	Sürgünler gelişime dönemin, çiçeklenme sonrası meyve büyütme dönemi uygulanır.	100 litre su 250-300 cc	2-2.5 litre / da
Narenciye, Muz ve Fındık	Sürgünler gelişime dönemin, çiçeklenme sonrası meyve büyütme dönemi uygulanır.	100 litre su 250-300 cc	2-2.5 litre / da
Tüm Endüstri Bitkileri	Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekrerrde uygulanır	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Tüm Baklagiller	Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekrerrde uygulanır	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Tüm Tarla Bitkileri	Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde iki tekrerrde uygulanır	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da
Tüm Yeşil Alan ve Yem Bitkileri	Her biçimden on gün sonra uygulanır.	100 litre su 200-250 cc	1.5-2 litre / da



GKC ZNP

GKC ZNP

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER NP'li SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	5
Organik Azot (N)	0,5
Üre Azot (NH ₂ -N)	4,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	25
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	25
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2
Toplam (Humik + Fulvik) Asit	7
Maksimum Klor (Cl)	0,5
pH Aralığı	3-5



GENEL ÖZELLİKLERİ

Bünyesinde bulundurduğu yüksek oranda fosfor ve çinko'nun özel formülasyonu sayesinde üretimde önemli etkiler gösterir.

Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi teşvik eder.

Çinko noksanlığında görülebilecek bozuklukları da önler.besin elementlerinin de bitkiye geçişine yardımcı olur.

Bitkide vejetatif dönemde ve meyve tutumu döneminde bünyesinde ki azot ve fosfor varlığı nedeniyle sağlıklı bir bitki olarak kalmasını ve bol ürün vermesini sağlar.

Bünyesinde bulundurduğu fosfordan dolayı bitkinin kök yapısının güçlü ve daha derinlere gitmesini sağlayarak, bitki besin maddelerinden daha uzun süre yararlanmasını sağlar.

Toprağın daha derin başka katmanlarının kullanılması ile daha fazla besin almasını sağlar.



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI:	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri ve Çilek	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 4-6 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 350-400 cc	2.5-3 litre /da
Tüm Tarla Açık Alan Sebzeleri ve Çilek	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Yapraklı Yenen Kışlık Sebzeler	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Kavun, Karpuz, Kabak	İlk meyve teşekkülünden başlanarak, meyve verme süresi boyunca 3 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Ş. Pancar, Havuç, Patates, Soğan ve Sarımsak vs.	Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre /da
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları	Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre /da
Narenciye, Muz, Fındık	Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 400-500 cc	3-4 litre /da
Bağlarda	Koruk teşekkülünden itibaren hasada kadar 4 tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 350-400 cc	2.5-3 litre /da
Tüm Endüstri Bitkileri	Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Baklagiller	Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Tarla Bitkileri	Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde iki tekrerrürde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da
Tüm Yeşil Alan ve Yem Bitkileri	Her biçimden on gün sonra uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2-2.5 litre /da



GKC DENİZ YOSUNU

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER SIVI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	15
Alginik Asit	0.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
Maksimum EC	2.24 dS/m
pH Aralığı	8-10

W/W



GENEL ÖZELLİKLERİ

- Bitkinin direncini artırır, büyümesini hızlandırır.
- Toprak için gerekli olan mikrobik aktiviteyi artırır böylece bitkinin daha güçlü köke sahip olmasını sağlar.
- Daha güçlü kök, bitkinin kök hastalıklarına karşı daha dayanıklı olmasını ve toprağa atılan mineral gübrelerden maksimum seviyede faydalanabilmesini sağlar,
- Hastalıklara ve zararlı böceklerle karşı direnci artırır.
- Topraktaki besin maddelerinin bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
- Bitkideki klorofil seviyesini artırır ve bu da bitkinin daha fazla fotosentez yapmasını sağlar.



GKC DENİZ YOSUNU

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek v.s)	Ekim dikimden itibaren haftalık uygulamalar şeklinde sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	750-1000 cc / da
Tüm Açık Alan Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek v.s)	Fidelerin şaşırtılmasından sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	1000-1250 cc / da
Tüm Kışık Sebzeler Kivircik, Marul, Aysberg, Pırasa, Ispanak, Lahana	Fide döneminden itibaren 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	1000-1250 cc / da
Kesme Çiçekçilikte	Çiçekten sonra 15 gün arayla sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	750-1000 cc / da
Kavun, Karpuz ve Kabak	Çiçek öncesi, yumru bağlama dönemi ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	1000-1250 cc / da
Tüm Yumrulu Bitkiler (Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Turp, Ş. Pancar, Sarımsak v.s)	Çiçek öncesi, yumru bağlama dönemi ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	1000-1250 cc / da
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Vişne, Kiraz, Kaysı, Ayva, Erik, Şeftali)	Farekulağı dönemi, meyve bağlama dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır.	100 litre suya 250-300 cc	1000-1500 cc / da veya 75-100 cc/ağaç
Narenciye Muz Zeytin Kivi Antep Fıstığı	Farekulağı dönemi, meyve bağlama dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır.	100 litre suya 250-300 cc	1000-1500 cc / da veya 75-100 cc/ağaç
Bağlarda	Çiçekten sonra, ince koruk dönemi ve meyve büyütme dönemi uygulanır	100 litre suya 150-200 cc	750-1000 cc / da veya 25 cc/omca
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Pamuk, Yer Fıstığı)	İkinci çapa sonrası her sulama suyu ile topraktan yirmi günde bir yapraktan uygulanır	100 litre suya 200-250 cc	1000-1250 cc / da
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Soya, Fasulye, Bakla, Börülce)	İkinci çapa sonrası her sulama suyu ile topraktan yirmi günde bir yapraktan uygulanır	100 litre suya 200-250 cc	1000-1250 cc / da
Tüm Yem Bitkileri ve Yeşil Alanlarda (Yonca, Korunga ve Fiğ)	Her biçimden sonra sulama suyu ile topraktan ve yapraktan uygulanır	100 litre suya 200-250 cc	1000-1250 cc / da
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf, Pirinç)	Yabancı ot ilacı ile kardeşlenme döneminde yapraktan uygulanır	100 litre suya 200-250 cc	-----




GKC Bio

pH REGÜLATÖRÜ



Notlar...





Gkc Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Merkez Ofis :

Güzeloba Mh. 2110 Sk. Ali Doğan Ap. No:1/C

Muratpaşa/ANTALYA PK. 07235

Tel : + 0 0242 250 33 33 Gsm : + 90 536 847 12 96

Fabrika: Çamlıca OSB Mh.Adnan Menderes Bulvarı No:16

Bucak/BURDUR

Tel : + 0 248 502 1818

www.gkcorganik.com.tr / info@gkcorganik.com.tr

